




Search WorldCat

Buscar o catálogo em

[Busca Avançada](#) [Encontrar uma Biblioteca](#)

[Citar/Exportar](#) [Imprimir](#) [E-mail](#) [Compartilhar](#) [Permalink](#)

[Adicionar à lista](#) [Adicionar etiquetas](#) [Escrever uma crítica](#) Classifique este item: 1 2 3 4 5



Fraturas diafisarias cominutivas do femur: osteossintese intramedular com hastes flexíveis de Ender a ceu fechado.

Autor: [Luiz Sergio M Pimenta](#); [Wolf Akl Filho](#); [Adelmo R Ferreira da Costa](#); [Carlos Vicente Andreoli](#)

Edição/Formato Artigo : Português

Fonte: Revista brasileira de ortopedia, Vol. 31, no. 6 (jun. 1996) p.502-6

Resumo: Utilizamos hastes de Ender a ceu fechado em 56 fraturas cominutivas da diafise femoral. Reavaliamos 41 pacientes, com 42 fraturas, com follow-up de dois anos. As fraturas com cominuicao unicortical mostraram-se estaveis apos a fixacao com haste de Ender, enquanto as com cominuicao bicortical tiveram tendencia a instabilidade, requerendo o uso de tracao ou fixador externo unilateral. O ato cirurgico foi relativamente [Ler mais...](#)

Classificação: (ainda não classificado)
[0 com críticas - Seja o primeiro.](#)

Assuntos [HUMANO.](#)
[MASCULINO.](#)
[FEMININO.](#)
[Ver todos os assuntos](#)

Mais como este [Ítens Similares](#)

Bibliotecas próximas

[AssociaÃ§Ã£o de Medicina Intensiva Brasileira](#)

Sao Paulo 01418-000, Brazil
< 1 m / km

[University Estadual Paulista \(Unesp\)](#)

Sao Paulo Sp 01419-901, Brazil
< 1 m / km

[USP - Faculdade de Economia](#)

Bibliotecário? [Selecione sua biblioteca](#)

[Solicitar Empréstimo / obter uma cópia](#)

Encontrar uma cópia na biblioteca

Desculpe, não sabemos sua localização. Por favor, entre ou entre novamente abaixo a sua localização.

Entradas aceitas por localização inclui:

Código Postal: ex. 43017 ou S7K-5X2
Cidade e/ou estado ex. Cincinnati, Ohio ou Ohio ou OH
Província: ex. Ontário ou ON
País: ex. Estados Unidos ou Reino Unido
Latitude Longitude: ex. 40.266000,-83.219250

Entre sua localização:

Detalhes

Tipo de Documento Artigo

Todos os Autores / Contribuintes: [Luiz Sergio M Pimenta](#); [Wolf Akl Filho](#); [Adelmo R Ferreira da Costa](#); [Carlos Vicente Andreoli](#)

Encontrar mais informações sobre:

Número OCLC: 69876981

Resumo:

Utilizamos hastes de Ender a céu fechado em 56 fraturas cominutivas da diafise femoral. Reavaliámos 41 pacientes, com 42 fraturas, com follow-up de dois anos. As fraturas com cominuição unicortical mostraram-se estáveis após a fixação com haste de Ender, enquanto as com cominuição bicortical tiveram tendência a instabilidade, requerendo o uso de tração ou fixador externo unilateral. O ato cirúrgico foi relativamente simples e rápido. Houve um caso de pseudartrose, em uma fratura segmentar, e nenhum de infecção profunda. Não houve casos de quebra da haste. Na maior parte dos casos a movimentação do joelho não apresentou limitação, mas em cinco foi necessária a remoção dos fios. É procedimento que preenche os requisitos básicos de fixação intramedular a céu fechado. (AU).

- Críticas

Críticas contribuídas por usuários

[Adicione uma crítica](#) e compartilhe suas opiniões com outros leitores. Seja o primeiro.

- Etiquetas

[Adicionar etiquetas](#) para "Fraturas diafisárias cominutivas do fêmur: osteossíntese intramedular com hastes flexíveis de Ender a céu fechado.". Seja o primeiro.

- Ítems Similares

Assunto(s): (12)

[HUMANO.](#)

[MASCULINO.](#)

[FEMININO.](#)

[ADOLESCENTE.](#)

[ADULTO.](#)

[MEIA-IDADE.](#)

[IDOSO.](#)

[Fraturas do fêmur -- Cirurg.](#)

[Diafises -- Cirurg.](#)

[Fixação intramedular de fraturas -- Instrum.](#)

[Estudos retrospectivos.](#)

[Resultado de tratamento.](#)

+ Dados Ligados